


Einsatzzeitpunkte von Schorf- u. Mehлтаumitteln im Apfelanbau 2015 Stand : 10. Februar 2015



- 1) Diese Mittel haben nur einen vorbeugenden Schutz. Bei Niederschlägen über 30 mm vorbeugender Schutz erneuern.
- 2) Anilino-Pyrimidine haben vor allem bei tieferen Temperaturen eine gute Wirkung. Gute Wirkung gegen Monilia. *Im Steinobst nicht zugelassen. Chorus ist bei Zwetschgen zugelassen.*
- 3) Blütenbehandlungen, weil diese Fungizide eine Wirkung auf Kelchfäule haben. Vor allem bei kelchfäuleanfälligen Sorten wie Idared, Gala und Rubinette einsetzen. 4) Captan max. 10 Anwendungen pro Jahr. SSH. 5) Ab Rotknospentadium bis Junifall einsetzen. *Im Steinobst nicht zugelassen.* 6) Flint, Tega zeichnet sich wie Stroby durch eine gute Dauerwirkung und hoher Regenbeständigkeit aus. Aus der Gruppe der Strobilurine (Stroby/Flint/Tega, Bellis) sind max. 4 Behandl. pro Jahr zugelassen. Flint, Tega, nur in Mischung mit Captan oder Folpet, kann zusätzlich max. 1 Abschlussbehandlungen eingesetzt werden. Flint, Tega soll weniger Spritzflecken bei den Abschlussbehandlungen verursachen. Flint, Tega nicht mischen mit Netzmittel, EC-Mittel! **Achtung: Wirkstoffgruppen abwechseln !: nach 2 Behandlungen aus der gleichen Wirkstoffgruppe sind die nächsten zwei Behandlungen aus anderer Gruppe durchzuführen !** 7) Bei Strobilurinen Pflanzenverträglichkeit und Mischbarkeit beachten! 8) Moon Experience zählt als SSH – Behandlung. 9) Bellis zählt als Strobilurin.