








## Tafeläpfel 2015

Stadium	Schorf/Mehltau	Schädlinge	Mittel	Bemerkungen
 B = 52 - C = 53	<b>Ab Stadium B - C</b> Evtl. 1 Behandlung mit <b>Kupfer</b> , dann 1-2 mal mit <b>Delan</b> oder <b>Captan</b> anschliessend <b>Dodine</b> <sup>6</sup> ,	<b>Beim Knospenaufbruch</b>  <b>Apfelblütenstecher</b>	<b>Reldan 40</b> <sup>28</sup> 0.12% <b>Pyrinex</b> <sup>30</sup> 0.15% <b>Alanto</b> <sup>6, 17, 30, 33</sup> 0.02% <b>Gazelle</b> <sup>6, 17, 33</sup> 0.02% <b>Audienz/Spintor</b> 0.02 %	Grosse Obstbaum- und <b>Austernschildlaus</b> mit <b>Paraffinöl</b> 3.5 % beh. <b>Max. 1,5 Kg Kupfer pro Jahr</b>  <b>Holzbohrerfallen</b> aufhängen 8 Stk. je ha, Alkohol alle 2 Tage wechseln
 D = 55	<b>Scala, Papyrus</b> <sup>1, 23</sup> , <b>Chorus</b> <sup>1, 23</sup> oder <b>Frupica</b> <sup>1, 24</sup> + jeweils <b>Mehltaumittel</b> zusetzen. Bis zum Abblühen. Max. 3 Behandlungen  <b>Nach Warndienst !</b>	<b>Rote Spinne</b> gegen Wintereier  <b>Blattläuse</b>	<b>Apollo SC</b> <sup>2</sup> 0.04% <b>Trevi</b> <sup>2</sup> / <b>Matacar</b> <sup>2</sup> 0,05%  <b>Pirimor</b> <sup>3</sup> 0,04% <b>Alanto</b> <sup>3, 6, 17, 25, 30, 33</sup> 0,02% <b>Gazelle</b> <sup>3, 6, 17, 33</sup> 0.15% <sup>18</sup> <b>Neem Azal</b> <sup>4</sup> 0.3% <sup>4</sup> <b>Oikos</b> <sup>4</sup> 0.1% <sup>4</sup> <b>Tepeki</b> <sup>6</sup> 0.01 % <b>Actara</b> <sup>2, 3, 32, 33</sup> 0.02%	<sup>1</sup> <b>Kelchfäulewirkung</b> <sup>2</sup> max. 1 x pro Saison <b>Jetzt Vorblütenkontrolle!</b> <sup>3</sup> max. 1 Behandl. pro Jahr auf dieselbe Art <sup>4</sup> keine Graslauswirkung, <b>Oikos</b> <b>ähnlich wie Neem Azal</b> <sup>25</sup> Frostspannerwirkung <sup>18</sup> <b>Gazelle</b> bis Ende Juni 0.15 % ab Juli 0.01 %
 E2 = 59 Vor der Blüte	oder bereits ab Stadium E bis 31. Juli <b>Stroby DF</b> <sup>13, 23</sup> oder <b>Flint</b> <sup>13, 23</sup> , <b>Tega</b> <sup>13, 23</sup> (Zusammen gesamthaft 4 Behandl. je Jahr) <b>Nach Warndienst !</b>	<b>Frostspanner</b> Vor dem Aufblühen  <b>Schalenwickler</b>	<b>Dimilin / Difuse / Nomolt Mimic</b> <sup>5</sup> / <b>Match</b> <sup>5</sup> / <b>Steward</b> <sup>5</sup> <b>Prodigy</b> <sup>5</sup> / <b>Audienz/Spintor Rimon/Nova100</b> <sup>5, 6, 30</sup> / <b>Affirm</b> <sup>5, 6, 32</sup>  <b>Mimic</b> <sup>5</sup> / <b>Match</b> <sup>5, 6</sup> / <b>Insegar /Steward</b> <sup>5</sup> / <b>Prodigy</b> <sup>5</sup> <b>Rimon/Nova100</b> <sup>5, 6, 30</sup> <b>Affirm</b> <sup>5, 6, 32</sup> , <b>Audienz/Spintor</b>	<sup>28</sup> <b>Reldan</b> mit Blattlausteilwirkung <sup>5</sup> Frostspanner- Eulen und Schalenwicklerwirkung <sup>33</sup> Max. 2 Beh. pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe <b>Sägewespenfallen</b> aufhängen
 F2 = 65 Blüte	<b>Ab Blüte</b> <b>SSH-Mittel</b> <sup>23</sup> (max. 4 x) oder <b>StrobyDF</b> <sup>13, 23</sup> (max. 4 x) <b>Flint, Tega</b> <sup>13, 23</sup> (max. 4 x) <b>Bellis</b> <sup>7, 13, 23</sup> (max. 3 x) <b>Bis 31. Juli</b>			Gegen <b>Kelchfäule</b> : in die Blüte <b>Chorus, Cercobin</b> <sup>6</sup> , <b>Scala, Frupica</b> oder <b>Dersal</b> <sup>6</sup> (Carbendazim). <sup>6</sup> max. 2 Behandl. pro Saison <sup>7</sup> max. 3 Behandl. pro Saison
 G = 67 Abblühen	<b>Gegen Berostungen</b> ab Blüte max. 5 x 4 – 5 kg/ha <b>Netzschwefel</b> <sup>10</sup> zusetzen	<b>Sofort beim Abblühen</b>  <b>Sägewespe</b>  <b>Blutläuse</b> vor Ende Mai	<b>Reldan</b> <sup>28</sup> 0,12% <b>Quassan / Quassin</b> 0,2% <b>Pyrinex</b> <sup>30</sup> 0,15% <b>Alanto</b> <sup>3, 6, 17, 30, 33</sup> 0,02% <b>Gazelle</b> <sup>3, 6, 17, 33</sup> 0,02% <b>Actara</b> <sup>2, 17, 32, 33</sup> 0,02%  <b>Movento Arbo</b> <sup>6, 31</sup> 0.125 %	<sup>23</sup> in Tankmischung mit <b>Captan</b> oder <b>Delan</b> <b>Jetzt Nachblütenkontrolle !</b> <sup>30</sup> <b>Gewässerabstand 50 m.</b> <sup>17</sup> Blattlauswirkung <sup>31</sup> Wirkung auf Austern- & Kommaschildlaus beim Schlupfbeginn
 I = 71	<b>Ab Junifall</b> <b>Captan, Malvin, Folpet</b> <sup>11</sup> plus <b>Mehltaumittel Nimrod, Topas Viro</b> <sup>27</sup> , <b>Bellis</b> <sup>7, 13</sup> <b>Moon Experience</b> <sup>7</sup> , <b>Moon Privileg</b> <sup>7</sup> , <b>Cyflamid</b> <sup>6</sup> + <b>Netzmittel</b> Nach Hagelschlag sofort : <b>Captan/Malvin</b> oder <b>Flint/Tega +Malvin</b> ausbringen und Abschlussbehandlungen weiterführen. In Feuerbrandgebieten sofortige Behandlung mit max. 2 kg <b>Kupfer</b>	<b>Blattläuse</b>  <b>Rote Spinne</b>	<b>Pirimor</b> <sup>3, 9</sup> ab Juli 0,02 % <b>Alanto</b> <sup>3, 6, 13, 6, 17, 30, 33</sup> 0,02% <b>Gazelle</b> <sup>3, 6, 17, 33</sup> 0,015% <sup>18</sup> <b>Tepeki</b> <sup>6</sup> 0.01 % <b>Movento Arbo</b> <sup>6, 31</sup> 0,09 %-0,125%  <b>Apollo SC, Trevi, Matacar, Kiron</b> <sup>10</sup> , <b>Magister</b> <sup>19, 20</sup> <b>Zenar</b> <sup>19, 20</sup> , <b>Kanemite</b> <sup>2, 20, 32</sup> <b>Arabell</b> <sup>(2, 21, 30)</sup> , <b>Envidor</b> <sup>(2, 10, 21)</sup>	<sup>9</sup> Teilwirkung Kommaschildlaus <sup>14</sup> <b>Nach abgehender Blüte bis Ende Mai (Gewässerabstand 6 m)</b> <b>Austern- &amp; Kommaschildläuse</b> : beim Schlupfbeginn <b>Movento Arbo</b> d.h. Ende Mai/Anfang Juni. <b>Nach Hagelschlag sofort Captan, Malvin</b> ausbringen inkl. Abschluss-spritzungen <sup>10</sup> Rostmilbenwirkung <sup>19</sup> Teilwirkung auf Rostmilben <sup>20</sup> gegen mobile Stadien <sup>21</sup> gegen Larven u. Nymphen
 J = 73	50 % (Berostungengefahr). In Parzellen mit geringeren Schäden (Tafelobst noch möglich) max. 0.3 kg <b>Kupfer</b> 50 % behandeln.  <b>Bis 31. Juli</b>	<b>Blutläuse</b>  <b>Frucht-/Apfelwickler</b> Letzte Mai-Woche Warndienst beachten	<b>Pirimor</b> 0,04 % bei Temp. über 22°C. <b>Netzmittel</b> zusetzen. (2 Beh. im Abstand von 10-14 Tagen) <b>Movento Arbo</b> <sup>6</sup> 0.125 %  <b>Insegar, Hagar</b> <sup>9</sup> 0.04% <sup>15</sup> <b>Steward</b> <sup>15, 12, 22</sup> ,	<b>Jetzt Sommerkontrolle !</b> <sup>11</sup> <b>Folpet</b> nicht bei Bienen ! <b>Fallenkontrolle</b> <sup>27</sup> max. 4 Behandlung pro Jahr <sup>32</sup> <b>nur in Obstanlagen</b> Wenn gleichzeitig Kleiner Fruchtwickler
	<b>Abschlussbehandlung</b> 2 - 3 Behandlungen im August bis 3 Wochen vor der Ernte, <b>Captan, Malvin, Folpet, Flint</b> <sup>13</sup> , <b>Tega</b> <sup>13</sup> , <b>Tega Plus</b> <sup>13</sup> , <b>Bellis</b> <sup>6, 13</sup> <b>Netzmitte</b> zusetzen. <b>Flint</b> <sup>13</sup> , <b>Tega</b> <sup>13</sup> ohne <b>Netzmittel!</b> <b>Flint</b> <sup>13</sup> , <b>Tega</b> <sup>13</sup> , <b>Bellis</b> <sup>6</sup> <b>nur in Mischung mit Captan oder Folpet</b> max. 1 Abschlussbehandlung. <b>Moon Experience</b> (zählt als SSH-Beh.) <b>Bellis</b> <sup>13</sup> (zählt als Strobykern) max. 2 Abschlussbeh.	<b>Apfelwickler</b> ca. anfangs-mitte Juni  <b>Warndienst beachten</b>	<b>Dimilin, Difuse, Mimic</b> <sup>12</sup> , <b>Nomolt, Prodigy</b> <sup>12</sup> , <b>Rimon</b> <sup>6, 30, 12</sup> <b>Steward</b> <sup>15, 12, 22</sup> , <b>Audienz</b> <sup>22, 15, 12</sup> <b>Affirm</b> <sup>6, 12, 15, 22, 32</sup>  <sup>15</sup> <b>Steward</b> <sup>15, 12, 22</sup> , <b>Audienz</b> <sup>15, 12, 22</sup> <b>2. Behandlung nach 14 Tagen</b> <b>3. Behandlung nach 14 Tagen</b> mit <b>Dimilin, Difuse, Mimic</b> <sup>12</sup> , <b>Nomolt, Prodigy</b> <sup>12, 22</sup> <b>Rimon</b> <sup>12</sup>  <b>Isomate- C Plus-Verwirrung RAK 3 – Verwirrung</b> <sup>26</sup>	<b>Abendtemperatur</b> beobachten. <b>Bei Insegar, Prodigy 2. Behandlung</b> nach 4 Wochen mit <b>Dimilin, Nomolt, Mimic</b> <sup>12</sup> , <b>Prodigy</b> <sup>12</sup> . <sup>12</sup> <b>Schalenwicklerwirkung</b> <sup>13</sup> <b>Flint, Tega, Tega Plus, Stroby, Bellis</b> gesamthaft zusammen max. 4 x pro Jahr <sup>22</sup> <b>Kleiner Fruchtwickler-Wirkung</b> <sup>15</sup> Bei <b>Steward/Audienz/Spintor/Affirm</b> wird die erste Behandl. ca. <b>Anfangs Juni</b> ausgeführt, und <b>nach 14 Tagen</b> wird die <b>Behandlung wiederholt</b> . <sup>26</sup> <b>Apfelwickler (wie Isomate –CTT)</b>
	<b>Stippe</b> : Ab August 2 - 3 x bis 2 Wochen vor der Ernte <b>Calciumchlorid +Netzmittel</b> oder <b>Calshine</b> oder <b>Seniphos</b>	Frischer Naschfrass an den und/oder Schalenwickler <b>Reldan</b> <sup>29</sup> , <b>Steward</b> <sup>15, 12, 22</sup> abgestoppt werden.	Früchten (1 %) vom Apfelwickler kann Anfangs August mit <b>Pyrinex</b> <sup>30</sup> , <b>Audienz, Spintor</b> <sup>22, 15, 12</sup> (Sonderbewilligung)	<sup>29</sup> <b>Reldan, nicht mit Flint, Tega, Folpet mischen!</b>